



TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Acetato de dodemorf.
CONCENTRACION Y FORMULACION	Concentrado emulsionable que contiene 400 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.
MODO DE ACCION	MELTATOX [®] actúa rápida y eficazmente contra el agente causal de la cenicilla, tanto en forma preventiva como curativa, evitando que la enfermedad se expanda si el producto es aplicado dentro de las 48 horas de iniciado el proceso infectivo.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica IV. DL50 Oral: > 3 720 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 4 000 mg/kg (rata)
PRECAUCIONES	MELTATOX [®] es ligeramente tóxico para los peces; por lo tanto, no contaminar arroyos, ríos, estanques o lagos con productos químicos de desecho o envases vacíos. Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales. No emplear este envase para ningún otro fin. Eliminarlo de manera segura, enjuagándolo tres veces y enterrándolo en una fosa diseñada para el efecto. En caso de derrame, recoger el producto mezclándolo con tierra o aserrín y enterrarlo en la fosa. El producto puede ser PELIGROSO si se ingiere. IRRITANTE si se inhala. Puede ocasionar daño a los ojos. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER o FUMAR. Evitar: La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel. Usar: Traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. Antes de COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.
PRIMEROS AUXILIOS	Tras inhalación: reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica Tras contacto con la piel: Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

	Tras contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, oculista. Tras ingestión: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, evitar el vómito, buscar ayuda médica.
ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.
REGISTRO MAG	048-F

PRINCIPALES CARACTERISTICAS	
	Fungicida específico contra la cenicilla del rosal y de otras plantas ornamentales, en cultivos al aire libre y de invernadero.

RECOMENDACIONES DE USO			
Cultivo	Problema	Dosis	Observaciones
ROSAL (<i>Rosa</i> spp.)	Cenicilla- Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	250	Pulverizaciones preventivas cada 7 a 10 días. Si existe ataque, reducir los intervalos a 4 ó 5 días en los 3 ó 4 primeros tratamientos.
CRISANTEMO (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Cenicilla - Oidio (<i>Oidium chrysanthemi</i>)	200 - 250	Inmediatamente al inicio del ataque. Asperjar de 2 a 4 veces con intervalos de 10 a 14 días. Si la infección es intensa, hacerlo con intervalos de 3 a 4 días en los 2 ó 4 tratamientos iniciales.
ANTURIO (<i>Anthurium andreaeanum scherzerianum</i>)	Cenicilla - Oidio (<i>Erysiphe communis</i>)	200 - 250	Pulverizaciones a partir del inicio de la infección con intervalos de 10 a 14 días. Con fuerte infección aplicar de 2 a 3 veces, reduciendo el intervalo a 3 días.

BEGONIA (<i>Begonia rex</i>)	Cenicilla – Oidio (<i>Oidium begoniae</i>)	200 - 250	Aplicarlo cada 7 a 10 días hasta la floración. No aplicarlo en la floración. Probar previamente la fitotolerancia bajo condiciones locales.
--	---	--------------	---

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Para preparar la mezcla, se recomienda agregar la cantidad requerida de MELTATOX® directamente al tanque conteniendo agua y en movimiento constante, hasta formar una mezcla homogénea.
COMPATIBILIDAD	MELTATOX® es miscible con los insecticidas y fungicidas comunes. Es miscible además, con fertilizantes foliares como Nitrofoska foliar líquido y Fetrilon Combi.
FITOTOXICIDAD	No aplicar MELTATOX® cuando la temperatura sea muy elevada (más de 30°C) y haya fuerte insolación. Tampoco hacerlo sobre flores abiertas. De igual forma, no se recomienda asperjarlo en Gerbera y variedades de Lathyrus adoratus. Dada la diversidad de plantas ornamentales, es aconsejable efectuar siempre una prueba de fitotolerancia bajo las condiciones locales.
PERIODO DE CARENCIA	No se lo utiliza en cultivos no comestibles.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	No hay restricciones una vez secado el depósito aplicado.
PRESENTACIÓN	Frasco x 1 litro
® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.	